



## CUTISANOL® Gel

Subgalato de bismuto  
Óxido de zinco

**Forma Farmacêutica e Apresentações:**  
Gel de uso tópico – Frasco contendo 100g.

### USO EXTERNO USO ADULTO E PEDIÁTRICO

#### COMPOSIÇÃO COMPLETA

Subgalato de bismuto.....1,50mg  
Óxido de zinco.....45,0mg  
Excipientes: glicerol, propilenoglicol,  
metilparabeno, propilparabeno,  
lanolina anidra, álcool cetosteárilico  
+ laurilsulfato de sódio (cera  
emulsificante), oleato de isodecila  
(cera líquida), essência floral, álcool  
etilico e água purificada, qsp...1,00g

#### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

##### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Cutisanol® Gel é um medicamento especialmente formulado para prevenir e combater as dermatites causadas pelo uso de fraldas e também eritemas provocados por assaduras e brotoejas. Possui ação emoliente, umectante e hidratante, deixando a pele macia e perfumada. O uso diário de Cutisanol® Gel ajuda a proteger

a pele da ação do vento e proporciona sensação de frescor após exposição prolongada ao sol.

##### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Cutisanol® Gel tem na sua fórmula duas substâncias que agem formando uma fina camada sobre a pele, evitando ou diminuindo a formação de processos irritativos. Os derivados inorgânicos do bismuto, como o subgalato de bismuto, vêm sendo amplamente utilizados topicamente como emolientes, adstringentes e antissépticos. O óxido de zinco é categorizado e aprovado para o tratamento de assaduras e é o ingrediente mais comum encontrado na maioria dos medicamentos utilizados para este fim.

##### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Cutisanol® Gel não deverá ser utilizado em casos de alergia a qualquer um dos componentes da fórmula. Também não deve ser utilizado em ferimentos graves como cortes profundos ou queimaduras de 2º e 3º graus.

##### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

###### Advertências:

Este medicamento não deve ser ingerido.

**Precauções:** Evitar contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lavar

imediatamente com bastante água.

**Interações com outros medicamentos:**  
Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica.**

Cutisanol® Gel não apresenta contraindicações relativas a faixas etárias.

##### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve conservar Cutisanol® Gel em temperatura ambiente (entre 15 °C e 30 °C). Proteger da luz e umidade. Este medicamento tem validade de 48 meses após a data de fabricação.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

###### Características Físicas:

Cutisanol® Gel é uma emulsão homogênea de consistência cremosa, de coloração branca ligeiramente amarelada, e perfumada. **Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma**

**mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

## **6 .COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Uso Externo.

**Prevenção e combate a assaduras:** Sobre a pele limpa e seca, aplicar Cutisanol® Gel diretamente nas partes afetadas. Espalhar o medicamento fazendo movimentos circulares até a obtenção de uma camada fina sobre a pele, protegendo-a contra o contato da urina e das fezes. Utilizar após o banho, após cada troca de fralda ou a critério médico.

**Demais indicações:** Sobre a pele limpa e seca, aplicar Cutisanol® Gel diretamente nas partes afetadas. Espalhar o medicamento fazendo movimentos circulares até a sua completa uniformização. Utilizar de 3 a 5 vezes ao dia. Manter o tratamento até o desaparecimento dos sintomas, ou a critério de seu médico.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo**

**os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso haja esquecimento e, se os sintomas ainda persistirem, retome aplicação sem a necessidade de suplementação.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Até o momento não são conhecidas reações adversas relacionadas ao uso de Cutisanol® Gel.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não existem relatos de superdose com o uso de Cutisanol® Gel.

Em caso de ingestão acidental, procurar imediatamente o seu médico.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## **DIRETRIZES LEGAIS**

**MS: 1.5590.0001.001-1**

Farmacêutico Responsável: José Luiz Abrahão Filho – CRF/RJ nº 2844

**Registrado e Fabricado por:**

MR Laboratórios Farmacêuticos Ltda.  
Rua Eliseu Visconti, 5 – Santa Teresa  
Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.251-305  
CNPJ: 23.668.196/0001-92  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

**SAC: 0800 021 0809**

**www.mrpharma.ind.br**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

**Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 03/10/2018.**

03.05.453  
CUTISANOL\_GEL-BU-PAC-03.05.453-MRV1

